

Программа подкормок ЗЕМЛЯНИКА

Фенологическая фаза	Наименование	Способ внесения		Доза на 1 га, кг, л	Назначение обработки	
		по листу	фертигация			
Первый год						
	Сразу после посадки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 5-55-10 СТАРТ + МЭ		+	20	Активизация роста и развития корневой системы
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 1-0-2 РИЗОФЛЕКС		+	5	Стимулирование образования корней
	Сразу после посадки в течение лета	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-2 БИОФЛЕКС жидкий + МЭ	+		2	Стимулирование ростовых процессов (деление клеток и их вытягивание)
	Через 2е недели после первой обработки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 20-20-20 БАЛАНС + МЭ		+	20	Обеспечение сбалансированного роста и развития
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 0-5-3 МАНЦИН	+		1	Для улучшения фотосинтеза и синтеза гормонов роста
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-2 БИОФЛЕКС жидкий + МЭ	+		2	Стимулирование ростовых процессов (деление клеток и их вытягивание)
	Спустя 3и недели после первой обработки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 0-15-45 ФИНИШ + МЭ		+	20	Для обеспечения лучшего накопления сахаров и окраски плодов
Второй год, плановая урожайность						
	Перед началом вегетации	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 1-0-2 РИЗОФЛЕКС		+	5	Стимулирование образования корней
	Весна начало вегетации	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 0-5-3 МАНЦИН	+		1	Для улучшения фотосинтеза и синтеза гормонов роста
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-2 БИОФЛЕКС жидкий + МЭ	+		2	Стимулирование ростовых процессов (деление клеток и их вытягивание)
	Через одну неделю после первой подкормки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 1-0-2 РИЗОФЛЕКС		+	5	Стимулирование образования корней
	Интенсивная вегетация до начало цветения	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-2 БИОФЛЕКС жидкий + МЭ	+		2	Стимулирование ростовых процессов (деление клеток и их вытягивание)
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 1-0-0 БОРМАКС 20В	+		1	Для нормального протекания физиологических процессов, связанных с оплодотворением
	Конец цветения, завязь плодов и рост	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25*	+		3	Для нормального функционирования клеточных мембран

	Налив плодов через 5-7 дней после 5-й обработки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25*	+		3	Для нормального функционирования клеточных мембран
	Налив плодов через 5-7 дней после 6-й обработки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25*	+		3	Для нормального функционирования клеточных мембран
	Налив плодов через 5-7 дней после 7-й обработки	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25*	+		3	Для повышения плотности плодов и транспортабельности
	Начало окраски плодов	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25*	+		3	Для повышения плотности плодов и транспортабельности
	7 дней до начала сбора	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 0-15-45 ФИНИШ	+		4	Для обеспечения лучшего накопления сахаров и окраски плодов
	После сбора	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 4-0-0 АМИНОФЛЕКС жидкий + МЭ	+		2	Для лучшей подготовки к перезимовке
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 0-5-3 МАНЦИН			1	
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ НРК 1-0-0 БОРМАКС 20В			1	

* Применяется отдельно от других баковых смесей.

Норма расхода рабочего раствора при листовой обработке 500-1000 л/га.